

# Guide de poche pour les vaccinateurs

## Vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque

Le Comité consultatif national de l'immunisation ([www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/index-fra.php](http://www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/index-fra.php)) recommande le vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque aux personnes suivantes :

- 1) **Toute personne de  $\geq 65$  ans**
- 2) **Toute personne de  $> 5$  ans qui n'a pas déjà reçu le vaccin et qui présente un risque plus élevé de pneumocoques invasives, dont les personnes :**
  - qui fréquentent une garderie
  - qui sont autochtones
  - qui ont une hémoglobinose ou autre maladie falciforme
  - qui ont une asplénie fonctionnelle ou anatomique
  - qui ont une infection à VIH
  - qui ont une maladie immunodéprimante (p. ex., immunodéficits primaires; tumeurs malignes; états résultant d'une thérapie immunosuppressive, de la transplantation d'un organe plein ou de l'utilisation prolongée de corticostéroïdes systémiques; syndrome néphrotique)
  - qui ont un trouble médical chronique (p. ex., maladie cardiaque ou pulmonaire chronique comme la dysplasie bronchopulmonaire; diabète sucré; maladie rénale chronique, cirrhose ou écoulement chronique de liquide céphalorachidien), ainsi que les personnes :
    - qui sont alcooliques
    - qui portent ou qui vont recevoir un implant cochléaire
    - qui fument

### Contre-indications et précautions

N'administrez **PAS** le vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque :

- aux personnes qui ont présenté une réaction anaphylactique à une dose antérieure

### Posologie

La dose du vaccin polysaccharidique est de 0,5 mL pour tous les groupes d'âge.

### Effets secondaires

- On observe assez souvent une sensibilité et un érythème au point d'injection
- On observe parfois une légère fièvre
- On observe très rarement des effets secondaires modérés à graves

### Autres considérations et conseils

- Le vaccin contre le pneumocoque peut être administré en même temps que le vaccin contre l'influenza, sur l'autre bras
- La pneumonie à pneumocoque est une complication de l'influenza
- Le vaccin contre le pneumocoque peut être administré toute l'année
- La plupart des gens n'ont besoin que d'une dose du vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque au cours de leur vie; pour l'immunisation des sujets immunodéprimés, consultez le Guide canadien d'immunisation : <http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p03-07-fra.php>